NUTRICIA
Neocate®
SYNEO

400 g e

DANONE

1004289
144528

5 016533 654592

GR **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Για τη διατροφική διαχείριση της αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα, πολλαπλών τροφικών αλλεργιών και/ή/και ανθεξίας στον συστηματικό φόρτιο/ώριμο βιοκαμμένη σε αμινόξεα. Βρεφική φόρμουλα σε σκόνη με βάση αμινόξεα, διατροφικά πλήρης με Bifidobacterium breve M-16V, FOS εξόδυμες ίνες. Υποαλλεργικό.

Σημαντική σημείωση: Για εντεροφή χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χρησιμοποιείται υπό ιατρική επίβλεψη κοινωνικά την πλήρη εξέταση όλων των επιλογών διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού. Κατάλληλο ως αποκλειστική διατροφή για βρέφη κάτω του 1 έτους. Το Neocate Syneo περιέχει Bifidobacterium breve M-16V και δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πρόωρα βρέφη ή βρέφη τα οποία είναι ανοσοκατασταλμένα. Δεν συνιστάται σε βρέφη με κεντρικό φλεβικό καθετήρα ή σύνδρομο βραχέος εντέρου χωρίς πλήρη εξέταση όλων των κινδύνων και των ωφελειών από ειδικό επαγγελματία υγείας.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε δροσερό και στεγνό μέρος. Πλύνετε και απολυμανθείστε τα κοπάνα στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά τα σκόνιμα, κατανάλωσε εντός 2 εβδομάδων. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Παράγεται από την SHS International Ltd.

Νοπιλίκ Α.Ε. - Παράδεισος 17 μλμ Ελληνής Οδός Αθηνών Λαμίας & Καλομάτας 2- 14564
Ν. Κηφισιά- Τηλ 2106248547 - Φραγμό φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση
Αρ. Γνωστοποίησης: ΕΟΦ/6811/Ζ*01-2017
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nutricia-medical.gr
Ανάλυση πριν από: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka, mnohočetných potravinových alergiích a jiných indikacích vyžadujících výživu na bázi aminokyselin. Nutričně kompletní kojenecká výživa na bázi aminokyselin s *Bifidobacterium breve* M-16V a FOS vláknitanami, v prášku. Hypoalergenní.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem, po zvážení všech možností výživy, včetně kojení. Vhodné jako jediný zdroj výživy pro kojence do jednoho roku věku. **Neocate Syneo obsahuje *Bifidobacterium breve* M-16V a není vhodné pro použití u předčasně narozených nebo u imunokompromitovaných kojenců. Nedoporučuje se používat u kojenců s centrálním žilním katetrem, s postpyloroickou výživovou sondou nebo u kojenců se syndromem krátkého střeva, aniž by byla odborníkem ve zdravotnictví plně zvážena všechna rizika a přínosy a aniž by byl pacient monitorován.**

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Po otevření spotřebujte do 2 týdnů. Balení v ochranné atmosféře.

Výrobce: SHS International Ltd., Velká Británie

Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001
Více informací na: www.neocate.cz
Čs.
Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

NUTRICIA
Neocate®
SYNEO

0-12 μήνες/ měsíců

Υποαλλεργική βρεφική φόρμουλα σε μορφή σκόνης με βάση τα ελεύθερα αμινόξεα
Hypoallergenní kojenecká výživa na bázi aminokyselin, v prášku

- **Πιστοποιημένη σύνθεση με *Bifidobacterium breve* M-16V, scFOS και lcFOS ινες**
- ***S Bifidobacterium breve* M-16V a s vláknitanami scFOS a lcFOS**

- **Οι οδηγίες παρασκευής διαφέρουν από άλλες φόρμουλες: ελέγξτε και ακολουθήστε προσεκτικά**
- **Návod na přípravu je odlišný od jiných přípravků. Pečlivě si jej pročtěte a dodržujte.**

400 g e

GR **Προτεινόμενη δοσολογία:** Η ποσότητα της τροφής και της αραίωσης θα πρέπει να καθορίζεται από ιατρό ή διατροφολόγο μόνο, και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την κατάσταση του ασθενούς.
Συνιστώμενη συγκέντρωση: Κόψτε μεζούρα περίπου 4,8gr σκόνης, δεν αποτελεί μέτρο ποσοτικών λαμβάνει (14,4% w/v) προσθέστε μία κοφτή μεζούρα σκόνης για κάθε 30ml νερό. Η συγκέντρωση στην προτεινόμενη δόσιμη (πχ. 14,4 g σκόνης συμπληρωμένα με νερό έως τα 100ml) είναι 360 mOsmol/kg H_2O.
Προετοιμασία: Πλύνετε καλά τις μεζούρες μετά τη χρήση. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΡΗΗΗ ΖΥΜΩΣΗ ΜΕ ΤΕ ΟΔΗΓΕΣ. ΜΗΗ ΣΟΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΡΡΩΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣΣ ΣΑΣ.
1. Πλύνετε τα χέρια σας και καθαρίστε τα χώρο παρασκευής. Αποστειρώστε τα μπιμπερό κατής θήκης.
2. Βράστε ή χρέσιμο νερό φρεσκό 5 λεπτά, χάστε την αποστειρωμένη ποσότητα νερού στο αποστειρωμένο μπιμπερό, τοποθετήστε το πώμα στο μπιμπερό κατεφέρτε να κρυώσουν αλλιώς αφήστε μη 30 λεπτά, μέχρι κάτω το νόμιστε μόλις κάτω κάρφο.
3. Ζυμώστε καλά τις μεζούρα που υπάρχει στο κουτί για τη βρέβεια ανάλογα κάθε μεζούρα μεζούρα. Μην πιάζετε τη σκόνη μέσα στη μεζούρα. Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη μεζούρα.
4. Προσθέστε τις ενδεικνυόμενες μεζούρες πρώτα στο νερό. Τοποθετήστε το κατάλληλη βρέφη κλειστοκαλύπτρα μέχρι η σκόνη να διαλυθεί. Τρέψτε το νόμιμο βεβιαιωμένο στο ανάλογα ανάλογα κατάλληλη θερμοκρασία τοποθέτησης λίγες στιγμές στον κοφτό νερό. Μη χρησιμοποιήσετε μεγάλες μετά την παρασκευή.
5. Τρέψτε υπόλοιπο που μένει στο μπουκαλάκι από μία ώρα πάλι ρόστο πρέπει να πετάτε. Το δόσιμο δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεται κατά το πάλι.
Ζυμώστε: Η βρεφική φόρμουλα σε σκόνη δεν είναι αποστειρωμένη, Η βρεφική φόρμουλα πρέπει να παρασκευάζεται μόνο πριν την κατανάλωση. Μην βράζετε το δόσιμο και μη χρησιμοποιείτε ανάμεσα μικροκυμάτων και αποφεύγετε η να ζεστάνετε το δόσιμο. Η θέρμανση κατά ανεπιλογή προστατεύει μπορεί να πατρόφεστν τα ωφέλη του βιβλιοθεσιακών breve M-16V.
Επιστήμανση σδοκτής: ζρονίδιος: Η καλή υγιεινή των δοντιών είναι σημαντική για βρέφη κοιτάσεα, καθώς η παρατεταμένη ή συχνή επαφή ρόφησης κατεφεύγει με δόντια αυξάνεται τον κίνδυνο της βέβαιας των δοντιών. Βεβιαιωμένα σε τα δόντια των παιδιών καθαρίζονται μετά το τελευταίο γεύμα.
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε δροσερό και στεγνό μέρος. Πλύνετε και απολυμανθείστε τα κοπάνα στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το άνοιγμα, κατανάλωσε εντός 2 εβδομάδων. Συσκευάζεται σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
Συστατικά: αποβεγαλίνο σφαιρα γλυκόζης, εξαγωγείαμενα (ρυπιά ιδίαν μηλέκιν ωμηρίου ελαίου), τριγλυκερίδια μέσης αλύσεως (καρυδέλαιο ηλιέλαιο), γλυκόζη, L-Αλανίνη, γλυκαρυδοκαρβονικό οξέβιοα, L-Βαλίνη (L-ισοκαρπικό, L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Γλουτάμη, L-Λυσίνη, L-Θρεονίνη, L-Φενυλαλανίνη, γλυκαρυδοκαρβονικό οξέβιοα, L-Βαλίνη (L-ισοκαρπικό (sc-FOS), κιτρικό L-ασκορβικό, L-ασκορβικό, L-Ασπαρτικό, L-Κυστεΐνη, L-Ιστιδίνη, L-Τυροσίν, L-Σερίνη, L-Τρυπτοφάνη, L-Μεθειονίν, γαλακτικό ασβέστιο, τριφωσφορικό κάλιο, γλυκαρυδοκαρβονικό οξέβιοα, θειικό μαγνήσιο, γλυκαρυδοκαρβονικό οξέβιοα, L-Βιταμινόλη, κιτρικό οξέβιοα, γλυκαρυδοκαρβονικό μαγνήσιο, L-Κλεβιόνιν, ένωση από Cryptithecodinium cohnii ταβδοκαθ φυσιόρροφο ασβέστιο, ένωση από Mortierella alpina, L-αστορβικό μαγνήσιο, ινοσιτόλη, L-Ανακρεβικό οξύ, αντιοξιδωτικό (ενεθίλη ηλιόκιο), πολυπτιά ανακρεβικό, ταυρίνη, Bifidobacterium breve M-16V, θειικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L-Καρνιτίνη, οξύ (R,S-L-ενενοβρόλιν, άλας νατρίου 5'-μονοιδυροβρικής ουρίδης, 5-μονοιδυροβρική κυτιδίνη, νικοτιναμίδιο, D-πιντοτενικό ασβέστιο, άλας νατρίου 5-μονοιδυροβρικής ουσίας, 5'-μονοιδυροβρική βιβοκιάνη, άλας νατρίου 5-μονοιδυροβρικής γουανοσίνης, θειικός χαλκός, νιτρική θειαμίνη, ριβοπλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, οξική μεθοτ-κ-λιόβιο κάλιο, θειικός μαγνήσιο, πταροκλεϊκοκυκλικό οξύ, συπιμοπιδίνη, ιοδικιλιδίο κάλιο, χλωριούχο χρώμα, μολύβδαινικό νάτριο, D-βιοτίνη, γλυκαικλιφεριλίνη, κυανοκοβαλαμίνη, Bifidobacterium breve M-16V 10^{10} CFU/100g.
Συνιστώμενη συγκέντρωση/Doporučená koncentrace výživy:

Ηλικία βρέφους κατά προσέγγιση/ Přibližný věk dítěte	Βάρος βρέφους κατά προσέγγιση/ Přibližná hmotnost dítěte	Μεζούρες/ Počet odměrek	Χλιαρό βραασμένο νερό/ Zahřátená převařená voda	Κατανάλωσε εντός 24 ωρών/ Počet porcí za 24 hodin
5 μήνες/měsíců	7,5 kg	7	210 ml	4-5

CZ **Doporučený příjem:** Množství a ředění výživy určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti lékařské výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta.
Doporučená koncentrace výživy: 1 zarovnaná odměrka obsahuje přibližně 4,8 g prášku. Pro dosažení doporučené koncentrace (14,4 % obj.) přidejte na každých 30 ml vody jednu zarovnanou odměrku prášku. Osmolalita výživy při doporučené koncentraci (např. 14,4 g prášku rozředěných vodou na 100 ml výživy) je 360 mOsmol/kg H_2O.
Příprava: Návod pro podávání z kojenecké lahve: ZÓRAVÍ VAŠEHO DÍTĚTE ZÁVISÍ NA PŘESNÉM DODRŽOVÁNÍ NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ, NESPRÁVNÁ PŘÍPRAVA MŮŽE VAŠE DÍTĚ OHROZIT.
1. Umyjte si důkladně ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vysterilizujte láhve a savičku.
2. Ceníhou vodu určenou pro kojence přivařte po dobu 5 minut nebo dokud se nevypne vychlovamé konvice, nalijte požadované množství vody do vysterilizované láhve, uzavřete ji víčkem a nechte vodu vychladnout alespoň po dobu 30 minut tak, aby při kapnutí na vnitřní stranu zápěstí byla teplá.
3. Přikladenou odměrku nepřiřte práškem, zarovnejte ostým a suchým nožem. Prášek do odměrky nevtlačujte. Používejte pouze přikladenou odměrku.
4. Předepsaný počet odměrek prášku přidejte do vody. Láhev uzavřete a protřepávejte, dokud se prášek nerozpustí. Před krmením ještě vyzkoušejte správnou teplotu výživy kapnutím několika kapek na zápěstí. Podávejte hned po přípravě.
5. Pokud směs nespotřebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah lahve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přihřívat.
Upozornění: Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu připravujte vždy těsně před podáváním. **Výživu nepřevařujte. K ohřívání či přípravě výživy nepoužívejte mikrovlnnou troubu. Ohřívání a nesprávná příprava mohou limitovat přínosy *Bifidobacterium breve* M-16V.**
Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po podávání dennim krmení jsou zuby vyčištěny.
Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Po otevření spotřebujte do 2 týdnů. Balení v ochranné atmosféře.

Složení: sušený glukózový sirup, rafinované rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, triglyceridy se střední řetězcem (kokosový a palmový olej), řepkový, sójový), L-tryptofan, citronan vápenatý, chlorid hořečnatý, L-arginin, L-asparagin, L-leucin, L-prolin-acetát, L-glutamin, L-serin, L-valin, emulgátor (E472c), L-isoleucin, glycin, L-threonin, hydrogenfosforečnan draselný, L-fenylalanin, L-lysin, L-serin, L-histidin, L-alanin, hydrogenfosforečnan vápenatý, citronan trihraselný, chlorid sodný, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, L-cystin, glycerofosforečnan vápenatý, L-tyrosin, citronan vápenatý, chlorid holinchloridu, L-methionin, olej z Cryptithecodinium cohnii fosforečnan vápenatý, olej z plísně Mortierella alpina, L-asparát hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, antioxidanty (jitrocelnicový jitočlen, askorbylpalmitát), taurin, *Bifidobacterium breve* M-16V, síran železnatý, síran zinečnatý, L-karnitin, DL-α-tokoferyl-acetát, sodná sůl kukrdin 5'-monofosfátu, cyklin 3'-monofosfát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, sodná sůl inosin 5'-monofosfátu, adenosin 5'-monofosfát, sodná sůl guanosin 5'-monofosfátu, síran měďnatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, retinyl-acetát, jodid draselný, síran manganatý, kyselina pteroylmonoglutamová, fytomenadion, seleničitan sodný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.
Bifidobacterium breve M-16V 1 x 10^{10} KTJ/100 g.

To Βρέφος μπορεί να χρειαστεί μικρά λίτρες ή μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο. Η ποσοχωνή νέου τρόφιμο πρέπει να γίνεται μόνο υπό ιατρική εποπτεία. Η χρησιμοποίηση μικρότερων ή μεγαλύτερων ποσοτήτων ή πιο πυκνών ή πιο αραιών μπορεί κατά τις γιαρόκαν κατάστασή του γιαρόκαν ανάλογα μέσα. Κρίσεις πλέον γιαρόκαν ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα