

## **Příbalová informace: informace pro pacienta**

### **Ophthalm-Septonex 1 mg/g oční mast** carbethopendecinii bromidum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek Ophthalm-Septonex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalm-Septonex používat
3. Jak se přípravek Ophthalm-Septonex používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ophthalm-Septonex uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek Ophthalm-Septonex a k čemu se používá**

Oční mast Ophthalm-Septonex má dezinfekční vlastnosti a je proto vhodná pro léčbu nehnisavých zánětů předního úseku oka.

Ophthalm-Septonex se používá u dospělých, dospívajících i dětí při zánětech víček a spojivek, při poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech. Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení. Při závažnějších, zejména hnisavých zánětech, je nutné vyhledat lékaře.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalm-Septonex používat**

##### **Nepoužívejte přípravek Ophthalm-Septonex**

- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- při snížené tvorbě slz a při zánětech rohovky a spojivky s omezeným vylučováním slz.

##### **Upozornění a opatření**

Při závažných poraněních oka se o použití přípravku poradte s lékařem.

##### **Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalm-Septonex**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění účinku oční masti Ophthalm-Septonex a jiných očních mastí není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí jiné volně prodejné oční přípravky. Jestliže Vám oční lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalm-Septonex.

### **Přípravek Ophthalmol-Septonex s jídlm a pitím**

Potrava neovlivňuje účinnost přípravku. Při užívání přípravku Ophthalmol-Septonex můžete jíst a pít normálně.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek je možno použít krátkodobě i v těhotenství a při kojení.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Přípravek neovlivňuje pozornost. Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní.

### **Přípravek Ophthalmol-Septonex obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin)**

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

## **3. Jak se přípravek Ophthalmol-Septonex používá**

Obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku nebo nanáší na kůži více malých množství oční masti 3-5x denně maximálně po dobu 14 dnů. Při současné léčbě očními kapkami se mast používá obvykle na noc.

Je vhodné po vnesení masti do oční štěrby nechat zavřené oko na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vsřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmol-Septonex, než jste měl(a)**

Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

### **Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmol-Septonex**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

### **Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmol-Septonex**

Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Ophthalmol-Septonex se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky (frekvence výskytu nelze z dostupných dat určit): po vnesení do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení, svědění nebo může dojít ke zčervenání kůže víček, někdy i k výsevům drobných pupínků, puchýřků s mokváním.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex uchovávat**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Ophthalmo-Septonex obsahuje**

Léčivou látkou je carbethopendeciniu bromidum. Jeden gram oční masti obsahuje carbethopendeciniu bromidum 1 mg.  
Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda.

### **Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení**

Popis přípravku: mast bílé až nažloutlé barvy.  
Druh obalu: hliníková tuba, krabička.  
Velikost balení: 5 g oční masti.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 12. 2020**