

Analyse moyenne/Průměrný obsah				/100 g	
Energie/Energetická hodnota	kJ/kcal	630/150	Thiamine/Thiamin	mg	0,3
Lipides/Tuky	g	7,0	Riboflavine/Riboflavin	mg	0,4
dont/z toho			Niacine/Niacin	mg/mg NE	2,0/3,3
- acides gras saturés/nасыченé mastné kyseliny	g	1,6	Vitamine B ₆ /Vitamin B ₆	mg	0,4
- TCM/MCT	g	1,2	Acide folique/Kyselina listová	µg	60
- acides gras mono-insaturés/mononenasycené mastné kyseliny	g	4,1	Vitamine B ₁₂ /Vitamin B ₁₂	µg	0,7
- acides gras polyinsaturés/polynenasycené mastné kyseliny	g	1,3	Biotine/Biotin	µg	9,0
Glucides/Sacharidy	g	13,1	Acide pantothénique/Kyselina pantothenová	mg	1,4
dont/z toho			Sodium/Sodík	mg	70
- sucres/cukry	g	2,5	Potassium/Draslík	mg	130
- lactose/laktóza	g	< 0,5	Chlorure/Chlor	mg	50
- fructose/fruktóza	g	1,9	Calcium/Vápník	mg	150
- amidon/skrob	g	7,1	Phosphore/Fosfor	mg	95
Fibres/Vláknina	g	2,0	Magnésium/Hořčík	mg	15
Protéines/Bílkoviny	g	7,5	Fer/Železo	mg	2,4
Sel/Sůl	g	0,18	Zinc/Zinek	mg	1,8
Vitamine A/Vitamin A	µg RE	204	Cuivre/Měď	mg	0,36
dont/z toho			Manganèse/Mangan	mg	0,48
- B-carotène/B-karoten	µg RE	60	Fluoreur/Fluor	mg	0,24
Vitamine D/Vitamin D	µg	2,4	Sélénium/Selen	µg	12
Vitamine E/Vitamin E	mg α-TE	3,6	Chrome/Chrom	µg	12
Vitamine K/Vitamin K	µg	20	Molybdène/Molybden	µg	18
Vitamine C/Vitamin C	mg	18	Iode/Iod	µg	36
			Choline/Cholin	mg	32
Eau/Voda 67,5 ml/100 g			**AET: Apport Energétique Total		
Lipides/Tuky 42% AET**, Glucides/Sacharidy 35% AET**, Fibres/Vláknina 3% AET**, Protéines/Bílkoviny 20% AET**					

■ LOT: ▲ A consommer de préférence avant fin./Minimální trvanlivost do konce:

FRESENIUS KABI
Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65,
140 00 Praha 4, Česká republika
Fresenius Kabi France,
5 place du Marivel, 92316 Sèvres cedex



0562371/0 F-CZ

4 051895 037516

4 TRÈS ÉPAIS
EXTRÊMĚ HUSTÉ

Fresubin®

DB CRÈME

Arôme
Cappuccino
Příchuť
Cappuccino

**SANS
LACTOSE***

Index glycémique bas

Nízký glykemický index

**FRESENIUS
KABI**

Produit en Allemagne • Vyrobeno v Německu
min B₁₂. Baleno v ochranné atmosféře.
seleničitan sodný, vitamin K₁, biotin, vitamin D₃, vita-
chlorid chromitý, molybdénan sodný, jodid draselný,
β-karoten, barvivo (E 150d), vitamin A, kyselina listová,
nasy, riboflavin, vitamin B₆, thiamin, fluorid sodný,
kyselina pantothenová, chlorid manganatý, stran mēd-
nasy, pyrofosfát železa, stran zinečnatý, vitamin E, niacin,
sádrata (gylamat sodný, sacharin sodný), oxid hořeč-
vitamin C, chlorid sodný, regulátor kyselosti (E 524),
léctin), karameizovaný cukr, cholin hydrogentarát,
(s mlékem), citrát draselný, emulgátor (E 471, složky
centry se středně dlouhým řetězcem (MCT), aroma
rostitinné oleje (epkovy olej, slunečnicovy olej), malto-
Siózent: Voda, mléčná bílkovina, modifikovaný škrob,
maltoextrin, epaissants (E 1442, E 407), fructose,
triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arôme (lakti-
citate de potassium, emulsifiants (E 471, léctin), vita-
zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine B₆,
thiamine, fluorure de sodium, bêta-carotène, colorant
molybdate de sodium, iodure de potassium, sélénite
de sodium, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B₁₂.
Conditionné sous atmosphère protectrice.

4 x 200 g = 800 g
*S nízkým obsahem laktózy
dardisation Initiate, www.iddsi.org
*IDDSI - International Dysphagia Diet Stan-
dardisation Initiative, www.iddsi.org
a spotřebujte do 24 hodin.
lepně promíchat. **Skladování:** Při pokojové
teplotě. Po otevření uchovávejte v chladničce
jmeně promíchat. **Skladování:** Při pokojové

22 POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKÁRSKÉ ÚČELY.
s cukrem a sladidly. Pro řízenou dietní výživu při
malnutrici nebo jfím nízkou, zejména při poruše meta-
bolismu glukózy včetně dyságie. Nutriční kompetní,
vyšokobílkovina (1,5 kcal/g), vysokobílkovina (1,5 kcal/g),
s vlákninou pro doplnění běžné stravy, podáváte
itickou. Spíhuje úroveň IDDSI 4 (extrémně hustý). Se
sacharidy s pomalým uvolňováním pro lepší kontrolu
glykémie. S vysokým obsahem MUFAs. S nízkým obsa-
nem laktózy. Bez lepku. S nízkým obsahem sodíku.
Dávkování: 1-2 kelímky/den pro doplnění výživy
nebo 5 kelímku/den pro celkovou výživu, nebo podle
doporučení zdravotnického odborníka. **Důležité**
upozornění: Podáváte pod lékařským dohledem.
Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti
do 3 let. Užívat s opatrností u dětí do 6 let. Nevhodné v
případě galaktosémie. Nejlepší chuť vychlazený.

être déterminées et adaptées par le profes-
sionnel de santé selon les besoins du patient.
triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arôme (lakti-
citate de potassium, emulsifiants (E 471, léctin), vita-
zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, chlorure
de sodium, bêta-carotène, colorant molybdate de sodium,
iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine,
vitamine D, vitamine B₁₂. Conditionné sous atmosphère protectrice.

être déterminées et adaptées par le profes-
sionnel de santé selon les besoins du patient.
triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arôme (lakti-
citate de potassium, emulsifiants (E 471, léctin), vita-
zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, chlorure
de sodium, bêta-carotène, colorant molybdate de sodium,
iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine,
vitamine D, vitamine B₁₂. Conditionné sous atmosphère protectrice.

être déterminées et adaptées par le profes-
sionnel de santé selon les besoins du patient.
triglycérides à chaîne moyenne (TCM), arôme (lakti-
citate de potassium, emulsifiants (E 471, léctin), vita-
zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, chlorure
de sodium, bêta-carotène, colorant molybdate de sodium,
iodure de potassium, sélénite de sodium, vitamine K, biotine,
vitamine D, vitamine B₁₂. Conditionné sous atmosphère protectrice.

**SANS
LACTOSE***

Fresubin®

DB CRÈME

Arôme Cappuccino
Příchuť Cappuccino