

Υπόλοιπα:	na 100 g	na 1,2 g	na 2,4 g	na 3,6 g
Ενέργεια	1305 kJ 310 kcal	16 kJ 4 kcal	31 kJ 7 kcal	47 kJ 11 kcal
Υδατίδια	0 g	0 g	0 g	0 g
-z toho nasyc. mastné kys.	0 g	0 g	0 g	0 g
Σακχαρίδια	62 g	0,744 g	1,488 g	2,232 g
-z toho cukry	6 g	0,072 g	0,144 g	0,216 g
Βιολογικά	2,1 g	0,025 g	0,050 g	0,076 g
Ψάκκιο	27 g	0,324 g	0,648 g	0,972 g
Σόδι	3,5 g	0,042 g	0,084 g	0,126 g
Μινeralní látky:				
Σόδι	1400 mg	16,8 mg	33,6 mg	50,4 mg
Δρασικό	400 mg	4,8 mg	9,6 mg	14,4 mg

Διατροφικές πληροφορίες:	ανά 100 g	ανά 1,2 g	ανά 2,4 g	ανά 3,6 g
Ενέργεια	1305 kJ 310 kcal	16 kJ 4 kcal	31 kJ 7 kcal	47 kJ 11 kcal
Λίπος	0 g	0 g	0 g	0 g
-z toho nasyc. mastné kys.	0 g	0 g	0 g	0 g
Υδατάνθρακες	62 g	0,744 g	1,488 g	2,232 g
-ek toho sacharidy	6 g	0,072 g	0,144 g	0,216 g
Πρωτεΐνες	2,1 g	0,025 g	0,050 g	0,076 g
Φυτικές ίνες	27 g	0,324 g	0,648 g	0,972 g
Άλμυ	3,5 g	0,042 g	0,084 g	0,126 g
Ανιόντα ανισοστατικά:				
Na	1400 mg	16,8 mg	33,6 mg	50,4 mg
K	400 mg	4,8 mg	9,6 mg	14,4 mg

Υπόλοιπα/Παρασκευαστής:
BOHEMLK, a.s., Podzámkí 385,517 73 Opatowitz,
Česká republika, Tσεχική Δημοκρατία, www.nutrego.cz

Μinimální trvanlivost do: datum uvedené na obalu
Baleno v ochranné atmosféře.

Αριθμός παρτίδας / Ανάλυση κατά προτίμηση πριν από:
Ανατρέξτε στη συσκευασία.
Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.




Υπεύθυνος Κυκλοφορίας για την Ελλάδα:
AP Nutrihome Ολυμπιονικών 16, Γλυκά Νερά
Τ.Κ. 15354, Ελλάδα Τ: +30 2106655598
E: info@apnutrihome.gr, www.apnutrihome.gr

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
Αριθμός Γνωστοποίησης Ε.Ο.Φ.: 136045/5-12-2022
Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.

Δοσολογία:	1 odměrka = 1,2 g = 1,7 ml
Ποžadovaná konzistence na 100 ml tekutiny (vody)	
Μίρně hustá 0,5 odměrky	
Středně hustá (nektar) 1 odměrka	
Hustá (med) 2 odměrky	
Velmi hustá (puding) 3-4 odměrky	

Συνιστώμενη δοσολογία: συνιστώμενη δόση για συμπληρωματική διατροφή	
Απαιτούμενη σύσταση ανά 100 ml υγρού	
Χαμηλή πυκνότητα 0,5 μεζούρα	
Μέτρια πυκνότητα (νέκταρ) 1 μεζούρα	
Υψηλή πυκνότητα (μέλι) 2 μεζούρες	
Εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα (κρέμα) 3-4 μεζούρες	



(CZ) Nutrego ADENSIN, 400 g
Potravina pro zvláštní lékařské účely.

Nutrego ADENSIN je instantní prášek na bázi xanthanové gumy určený pro zahuštění nápojů a potravin (instantní zahušťovadlo) k dietnímu postupu při potížích s polykáním – dysfagií. Upravená konzistence zahuštěných nápojů nebo pokrmů umožňuje snadnější a bezpečnější polykání. **Důležité upozornění:** Zahušťovadlo je určeno pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Musí být podáváno pouze pod lékařským dohledem nebo na základě doporučení lékaře či jiného kvalifikovaného odborníka v oblasti klinické výživy. Není vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti do 3 let věku. S opatrností používejte u pacientů, kteří mají dietu s omezeným příjmem sodíku, a u dětí ve věku od 3 do 6 let.

Návod k použití: Přidejte takové množství Nutrego ADENSIN, aby bylo dosaženo potřebné konzistence. Pro dosažení požadované stupně zahuštění u vody či obdobné viskózní kapaliny slouží níže uvedená tabulka doporučeného dávkování. V případě zahuštění jiných nápojů a potravin přizpůsobte dávkování dle potřeby. Pro dávkování použijte přiloženou odměrku (1 odměrka = 1,2 g = 1,7 ml). Před použitím si umyjte ruce. Pro přípravu používejte čisté nádoby. **Doporučený postup:** 1. Odměřené množství prášku pomocí odměrky nasypejte do připravené nádoby. 2. Pomalu přilévajte tekutinu (nápoj) za stálého míchání, dokud se prášek zcela nerozpustí v požadovaném množství tekutiny. Pro lepší promísení použijte čistou lžičku nebo vidličku. 3. Pro zahuštění kašovitých jídel přidejte Adensin přímo do pokrmu, dokud není dosaženo požadované konzistence. Každou porci připravujte vždy čerstvou. Spotřebujte do 2 hodin od přípravy. Nespotřebovanou zahuštěnou potravinu nebo nápoj vždy zlikvidujte.

Složení: Maltodextrin, xanthan, chlorid draselný (může obsahovat mléko). **Skladování:** Skladujte v uzavřeném obalu na suchém a chladném místě (< 25 °C), ne však v lednici. Obsah po otevření spotřebujte do 1 měsíce.

Může obsahovat stopy mléka, vajec, sójových bobů, lepku, ryb, ořechů, arašídů, měkkýšů a koryšů.

(GR) Nutrego ADENSIN, 400 g
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Το Nutrego ADENSIN είναι μια σκόνη στιγμιαίας παρασκευής με βάση το κόμμι ξανθάνης για τη συμπύκνωση ροφημάτων και τροφών (στιγματικός παραγοντας) για τη διαιτητική διαχείριση των δυσκολιών κατάποσης-δυσφαγία. Η τροποποιημένη σύσταση των συμπυκνωμένων ροφημάτων και τροφών τα καθιστά ευκολότερα και ασφαλέστερα στην κατάποση. **Σημαντικά σημεία:** Ο στιγμιαίος στιγμιαίος παραγοντας προορίζεται μόνο για εντερική χορήγηση. Δεν προορίζεται για παρεντερική (πενδράξια) χορήγηση. Να χορηγείται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη ή σύμφωνα με τις συστάσεις του ιατρού ή του κλινικού διαιτολόγου. Δεν είναι κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χορηγείται σε ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με περιορισμένο νάτριο και σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. **Οδηγίες χρήσης:** Προσθέστε επαρκή ποσότητα Nutrego Adensin για να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση. Για να επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης του νερού ή υγρών με παράμολο (υδροχλωρικό οξύ), ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω πίνακα δοσολογίας. Για τη συμπύκνωση άλλων ροφημάτων και τροφών, προσροήστε τη δοσολογία αναλόγως. Για να μετρήσετε τη δόση, χρησιμοποιήστε τη μεζούρα που παρέχεται (1 μεζούρα = 1,2 g). Πριν από τη χρήση πρέπει να πλένετε τα χέρια σας. Χρησιμοποιήστε καθαρά δοχεία για την προετοιμασία. **Φυλάσσεται σε μέρος που δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.** **Συνιστώμενη διαδικασία:** 1. Με τη μεζούρα, προσθέστε την μετατροπική ποσότητα σκόνης στο δοχείο. 2. Προσθέστε αργά το υγρό (ροφήματα), ανακατεύοντας συνεχώς έως ότου η σκόνη διαλυθεί εντελώς στην επιθυμητή ποσότητα υγρού. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό κουτάλι ή πιρούνι για ευκολότερη ανάμειξη. 3. Για τη συμπύκνωση τροφών με σύσταση πολτού, προσθέστε απευθείας το Adensin στο γεύμα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή σύσταση. Κάθε μερίδα πρέπει να παρασκευάζεται αμέσως πριν από την κατανάλωση. Να καταναλώνεται εντός 2 ωρών από την παρασκευή. Πάντα να απορρίπτετε τις συμπυκνωμένες τροφές και ροφήματα που δεν καταναλώθηκαν. **Συστατικά:** Μaltodextrin, ξανθάνη, κλωροκάλιο (μπορεί να περιέχει γάλα). **Αποθήκευση:** Φυλάσσεται σε κλειστό δοχείο, σε δροσερό και ξηρό μέρος (<25 °C), αλλά ποτέ στο ψυγείο. Να καταναλώνεται εντός 1 μήνα μετά το άνοιγμα.

Μπορεί να περιέχει ίχνη γάλακτος, αυγών, σόγιας, γλουτένης, ψαριών, καρύδια, φιστίκια, μαλάκια και καρκινοειδή.



ADENSIN

Instantní zahušťovadlo řeší potíže s polykáním – dysfagií.

Κλινική διατροφή. Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Στιγματικός ρηκτικός παράγοντας. Για τη συμπύκνωση ροφημάτων και τροφών για τη διαιτητική διαχείριση των δυσκολιών κατάποσης - δυσφαγία.



Vlastnosti zahušťovadla:

- určeno k dietnímu postupu při potížích s polykáním – dysfagií
- neutrální chuť a vůně
- bez lepku
- rychlé zahuštění nápojů i potravin
- stabilní konzistence zahuštěných nápojů i potravin
- rezistentní vůči enzymatickému štěpení amylázou v ústech
- zachovává přirozený vzhled nápojů i potravin
- nevytváří hrudky v zahuštěných nápojích nebo potravinách

Ιδιότητες του ηηκτικού παράγοντα:

- ουδέτερη γεύση και οσμή
- χωρίς γλουτένη
- ταχεία συμπύκνωση ροφημάτων και τροφών
- επίτευξη σταθερής σύστασης των συμπυκνωμένων ροφημάτων και τροφών
- ανθεκτικό στην ενζυματική διάσπαση από την αμυλάση στο στόμα
- διατηρεί τη φυσική όψη των ροφημάτων και των τροφών
- δεν δημιουργεί σβόλους στα συμπυκνωμένα ροφήματα ή τροφές

Hmotnost/Bάρος: 400 g e

HEINZ DESIGN kontakt: 608 020 695 marketing@heinzdesign.cz	klient:	Charing Cross Scientific	zakázka:	Nutrego - Adensin 400 g_etiketa dóza_CZ		
	datum:	21. 04. 2022	exportní soubor:	eps		
	materiál:	PP	rozměr:	322 x 155 mm		
	barvy:	C	M	Y	K	UV lak