

Milupa BASIC-P

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pro řízenou dietní výživu při poruchách metabolismu aminokyselin nebo bílkovin (např. organické acidurie, poruchy cyklu močoviny) nebo při restriktivních dietách, kdy je nutné doplnění příjmu energie a mikroživin. Speciální výživa bez přidaných bílkovin se sacharidy, tuky, vitamíny, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Používejte pouze pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Přípravek musí být doplněn o vhodné zdroje bílkovin nebo aminokyselin, aby mohl být použit jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od narození.

Doporučený příjem: Určí lékař nebo pracovník kvalifikovaný v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.

Příprava a použití:

Příprava 100 ml výživy: 87 ml vody + 3 zarovnané odměrky prášku pro dosažení doporučené koncentrace výživy (13,2 % obj.).

PRO ZDRAVÍ KOJENCE JE DŮLEŽITÉ PEČLIVÉ DODRŽOVÁNÍ NÁVODU NA PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NESPRÁVNOU PŘÍPRAVOU MŮŽETE OHROZIT ZDRAVÍ SVÉHO DÍTĚTE.

Pro podávání z kojenecké lahve:

1. Umyjte si pečlivě ruce a místo, kde budete výživu připravovat. Vysterylizujte lahve a savičky. 2. Čerstvou vodu určenou pro kojence převařte po dobu 5 minut nebo dokud rychlovarná konvice nevypne. Nechte ji alespoň 30 minut chladnout tak, aby při kápnutí na vnitřní stranu zápěstí byla teplá. Potřebné množství vody nalijte do vysterylizované lahve. 3. Přiloženou odměrku naplňte práškem a zarovnejte ji čistým a suchým nožem. Prášek v odměrce nestlačujte. Používejte pouze přiloženou odměrku. 4. Předepsaný počet odměrek přidejte do vody. Lahve uzavřete a důkladně protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Pokud je třeba, do čerstvě připravené výživy lze přidat vhodný zdroj bílkovin nebo aminokyselin, poté výživu znovu protřepejte. Před podáváním zkontrolujte teplotu výživy kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. 5. Podávejte ihned po přípravě. Pokud výživu nespotřebujete do jedné hodiny od přípravy, obsah lahve zlikvidujte. Výživa se nesmí během podávání přehřívát.

Při přípravě sondové výživy se řiďte pokyny lékaře nebo odborníka v oblasti klinické výživy ohledně hygienické přípravy a manipulace s výživou, včetně instrukcí ke sterilizaci náčiní a použití zchlazené převařené vody.

Pro podání sondou:

1. Použijte přiloženou odměrku, nebo předepsané množství prášku odvažte. 2. K předepsanému množství prášku přidejte trochu z požadovaného množství vody a vidličkou rozmíchejte do hladké pasty. 3. Pokračujte v míchání a přidejte zbytek vody pro dosažení předepsané koncentrace výživy.

Při přípravě výživy k popíjení si umyjte ruce a používejte čisté náčiní. Řiďte se pokyny v bodech 1-3 z návodu pro podání sondou, nebo přidejte předepsané množství prášku do odměřeného množství vody, nádobu uzavřete a protřepejte, dokud se prášek nerozpustí. Použijte zchlazenou převařenou vodu nebo čerstvou vodu v závislosti na věku a zdravotním stavu pacienta.

Upozornění: Prášková kojenecká výživa není sterilní. Výživu pro kojence připravujte vždy těsně před podáváním. Výživu nepřevařujte a nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřívání výživy.

Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním krmení jsou zuby vyčištěny.

Skladování: Skladujte na chladném a suchém místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah spotřebujte do 1 měsíce po otevření. Baleno v ochranné atmosféře

Složení: glukózový sirup, rostlinné oleje (palmový, řepkový, kokosový, slunečnicový), hydrogenfosforečnan vápenatý, emulgátor (estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou), chlorid draselný, regulátor kyselosti (kyselina citronová), uhličitán sodný, hydrogenuhličitán draselný, uhličitán vápenatý, cholin bitartrát, olej z *Cryptocodinium cohnii*, olej z plísně *Mortierella alpina*, uhličitán hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, síran železnatý, antioxidant (askorbylpalmitát), síran zinečnatý, L-karnitin, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, síran měďnatý, riboflavin, DL- α -tokoferyl-acetát, retinyl-acetát, thiamin mononitrát, pyridoxin hydrochlorid, síran manganatý, retinyl-palmitát, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, fytomenadion, D-biotin, cholekalciferol, kyanokobalamin.

Průměrný obsah	ve 100 g prášku:	ve 100 ml výživy:*
Energetická hodnota	2217 kJ	293 kJ
	531 kcal	70 kcal
Tuky	31,3 g	4,1 g
z toho		
Nasycené mastné kyseliny	14,1 g	1,9 g
Polynenasycené mastné kyseliny	5,3 g	0,70 g
- Kyselina linolová (LA)	4,36 g	0,575 g
- Kyselina α -linolenová (ALA)	0,38 g	0,0501 g
- Kyselina arachidonová (ARA)	0,14 g	17,9 mg
- Kyselina dokosahexaenová (DHA)	0,14 g	17,9 mg
Sacharidy	62,2 g	8,2 g
z toho cukry	5,6 g	0,73 g
Vláknina	0 g	0 g
Bílkoviny	< 0,10 g	< 0,01 g
Sůl	0,44 g	0,06 g
Vitaminy		
Vitamin A	570 μ g	75,2 μ g
Vitamin D	9,49 μ g	1,25 μ g
Vitamin E	4,42 mg (α -TE)	0,58 mg (α -TE)
Vitamin K	22,8 μ g	3,01 μ g
Thiamin	0,46 mg	0,06 mg
Riboflavin	0,76 mg	0,10 mg
Vitamin B ₆	0,34 mg	0,04 mg
Niacin	4,56 mg (mg NE)	0,60 mg (mg NE)
Biotin	13,7 μ g	1,81 μ g

Kyselina listová	53,2 μ g	7,02 μ g
Folát	90,4 μ g	11,9 μ g
Vitamin B ₁₂	0,91 μ g	0,12 μ g
Kyselina pantothenová	2,66 mg	0,35 mg
Vitamin C	63,6 mg	8,40 mg
Minerální látky a stopové prvky		
Sodík	174 mg	23,0 mg
Draslík	455 mg	60,1 mg
Vápník	456 mg	60,2 mg
Hořčík	41,8 mg	5,52 mg
Fosfor	258 mg	34,1 mg
Chlorid	303 mg	40,0 mg
Železo	7,59 mg	1,00 mg
Zinek	3,80 mg	0,50 mg
Měď	0,38 mg	0,050 mg
Jód	60,8 μ g	8,03 μ g
Mangan	0,053 mg	0,007 mg
Chrom	15,2 μ g	2,01 μ g
Molybden	19,0 μ g	2,51 μ g
Selen	12,1 μ g	1,60 μ g
Jiné		
Cholin	91,1 mg	12,0 mg
Inositol	98,7 mg	13,0 mg
L-karnitin	7,80 mg	1,03 mg
Osmolarita		140 mOsmol/l

*Standardní ředění je 13,2 % obj., tj. 13,2 g prášku (3 odměrky) + 87 ml vody.

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

Výrobce: Milupa GmbH, Schleyerstrasse 4, 36041 Fulda, Německo

Kontakt pro ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov, infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz

Obsah: 400 g e